





Classe	Periodicità	Caratteri	Formazioni, litologie e condizioni correlative
G.1	Bassa	aree in cui i processi geomorfologici e litoclastici litologiche, giacitura non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfodinamici	alluvioni recenti e attuali (al, al1, al2) superfici con suoli retili (ar), antiche spiagge morfologiche (at); instabilità E 3, F, G del P.A.I. 1d del PTC
G.2	Media	aree in cui sono presenti fenomeni fransivi intensi e stabilizzati (naturalmente o artificiosamente), aree con elementi geomorfologici, litologici e giacitura del cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto, corai detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.	ciottoli a prevalenti elementi di arenaria Macigno (clmg), ghiaie e conglomerati calcarei (cal) Arenarie di Monte Gottardo, Fisch di Portomero - Fivizzano, Complesso di Monte Vero, Macigno; Calcarei nummulitici; Mafica, Dison; instabilità D 2b, E 2 del P.A.I. 2d del PTC
G.3	Elevata	aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acidità, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché ai processi di degrado di carattere antropico, aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenze, aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche, corai detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.	conoidi di dissezione (cd), frane quiescenti; instabilità B, C 1, C 2, C 3, Cd, D1, D2a E 2 del P.A.I. Scaglia rossa (Sc) 3d del PTC
G.4	Molto elevata	aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da siflussi	frane attive; instabilità C 4, C 5, C 6, del P.A.I. 4d del PTC